小学校 6 年生 かしわ


2019年5月





子どもがたばこを吸うと…


将来,病気になりやすい!!



平山雄, 計画調査, 1966-1982

吸い始める年齢が早ければ早いほど、がんや心臓病で死亡する危険が高くなります。 はじめの1本を吸わないことが大切です!!

たばこを吸わない人と比較したたばこを吸う人のがん死亡率





自分がたばこを吸わなくても…

まわりの人の健康も害します!

しゅりゅうえん 主流煙

たばこを吸う人が 吸い込む煙

たばこの先から 出る煙

ふくりゅうえん しゅりゅうえん 副流煙には主流煙よりも…

・ニコチン

2.8 倍

・タール

3.4 倍

・一酸化炭素

4.7 倍

・アンモニア

46 倍

な<u>どが多く含ま</u>れています。

・ホルムアルデヒド 50 倍

1日10本吸う人の横にいると…

1本分のたばこを吸ったことになります。





たばこの先から出ている煙 の方が、口から吸っている 煙よりも何倍, 何十倍も

有害物質を含んでいる

受動喫煙による健康への悪影響

※受動喫煙とは、他人が吸うタバコの煙を吸わされてしまうこと







※乳幼児突然死症候群:それまで元気だった赤ちゃんがなんの前ぶれもなく亡くなってしまうこと

発行:柏ノースモッ子作戦協議会・柏市保健所健康増進課(☎04-7167-1256)

協力:タバコ問題を考える会・千葉