

学校給食（実際に提供した給食）検査の結果について

柏市教育委員会 学校教育部 学校保健課

- 1 検査機関：株式会社 江東微生物研究所
- 2 検査方法：(1) ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリーによる核種分析
(2) 学校給食で実際に提供した1食を1週間（原則5日）分ごとに検査
- 3 採取期間：令和2年10月12日～10月16日
- 4 検査日：令和2年10月21日
- その他：(1) 検出下限値とはこの検査機器で算出することが出来る最小の値であり、検査環境、検体の状態等によって一定ではありません。
(2) 算出に当たっては、経口摂取による実効線量係数（mSv/Bq）、小学校は7～12歳、中学校は12歳～17歳を使用しました。
(3) 預託実効線量とは、20歳以下の子どもは70歳になるまでに被ばくする線量、大人は内部被ばくしてから50年間に被ばくする線量です。

6 (1) 小学校の検査結果および内部被ばくの預託実効線量

学校名	総重量 (kg) C	測定結果(下段：検出下限値) 単位：Bq/kg		放射性セシウムの 内部被ばく預託実効線量 (mSv)
		放射性 セシウム134 A	放射性 セシウム137 B	
1 土小学校	3.031	不検出 1.10	不検出 1.16	0 ～ 0.000082
2 中原小学校	3.340	不検出 1.21	不検出 1.35	0 ～ 0.000102
3 酒井根小学校	3.204	不検出 1.30	不検出 1.38	0 ～ 0.000103
4 酒井根西小学校	3.269	不検出 1.16	不検出 1.74	0 ～ 0.000110
5 酒井根東小学校	3.703	不検出 1.03	不検出 1.16	0 ～ 0.000096
6 名戸ヶ谷小学校	3.468	不検出 1.23	不検出 1.27	0 ～ 0.000104
7 増尾西小学校	2.885	不検出 1.23	不検出 1.27	0 ～ 0.000086
8 土南部小学校	3.382	不検出 1.17	不検出 1.37	0 ～ 0.000102
9 藤心小学校	3.071	不検出 0.97	不検出 1.29	0 ～ 0.000081
10 逆井小学校	3.361	不検出 1.10	不検出 1.27	0 ～ 0.000094
11 風早南部小学校	3.928	不検出 1.28	不検出 1.27	0 ～ 0.000120

【根拠】

(例) セシウム134の検出下限値が0.9, セシウム137の検出下限値が1.1, 給食の総重量が3.231kgの場合

$$\mathbf{A} 0.9 \times 0.000014 \times \mathbf{C} 3.231 + \mathbf{B} 1.1 \times 0.000010 \times \mathbf{C} 3.231 = 0.000076$$

(2) 中学校の検査結果および内部被ばくの預託実効線量

学校名	総重量 (kg) C	測定結果(下段：検出下限値) 単位：Bq/kg		放射性セシウムの 内部被ばく預託実効線量 (mSv)
		放射性 セシウム134 A	放射性 セシウム137 B	
1 柏第四中学校	3.937	不検出 1.21	不検出 1.35	0 ～ 0.000160
2 土中学校	3.906	不検出 1.02	不検出 1.26	0 ～ 0.000140
3 中原中学校	4.110	不検出 1.02	不検出 1.24	0 ～ 0.000146
4 酒井根中学校	3.613	不検出 1.20	不検出 1.57	0 ～ 0.000156
5 南部中学校	3.973	不検出 1.11	不検出 1.28	0 ～ 0.000150
6 逆井中学校	3.631	不検出 1.18	不検出 1.38	0 ～ 0.000147

【根拠】

(例) セシウム134の検出下限値が0.7, セシウム137の検出下限値が0.8, 給食の総重量が3.231kgの場合

$$\mathbf{A} 0.7 \times 0.000019 \times \mathbf{C} 3.231 + \mathbf{B} 0.8 \times 0.000013 \times \mathbf{C} 3.231 = 0.000077$$