

学校給食（実際に提供した給食）検査の結果について

柏市教育委員会 学校教育部 学校保健課

- 検査機関：一般財団法人 千葉県薬剤師会検査センター
- 検査方法：(1) ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリーによる核種分析
(2) 学校給食で実際に提供した1食を1週間（原則5日）分ごとに検査
- 採取期間：平成26年 6月16日～ 6月20日
- 検査日：平成26年6月23日
- その他：(1) 検出下限値とはこの検査機器で算出することが出来る最小の値であり、検査環境、検体の状態等によって一定ではありません。
(2) 算出に当たっては、経口摂取による実効線量係数（mSv/Bq）、小学校は7～12歳、中学校は12歳～17歳を使用しました。
(3) 預託実効線量とは、20歳以下の子どもは70歳になるまでに被ばくする線量、大人は内部被ばくしてから50年間に被ばくする線量です。

6 (1) 小学校の検査結果および内部被ばくの預託実効線量

学校名	総重量 (kg)	測定結果(下段：検出下限値) 単位：Bq/kg		放射性セシウムの内部被ばく預託実効線量 (mSv)
		放射性セシウム134	放射性セシウム137	
1 土南部小学校	2.912	不検出 0.97	不検出 1.1	0 ～ 0.000072
2 藤心小学校	2.852	不検出 1.1	不検出 1.1	0 ～ 0.000075
3 増尾西小学校	3.507	不検出 1.1	不検出 0.95	0 ～ 0.000087
4 逆井小学校	3.104	不検出 1.1	不検出 1.1	0 ～ 0.000082
5 風早南部小学校	2.824	不検出 1.0	不検出 0.93	0 ～ 0.000066

【根拠】

(例) セシウム134の検出下限値が0.9, セシウム137の検出下限値が1.1, 給食の総重量が3.231kgの場合

$$0.9 \times 0.000014 \times 3.231 + 1.1 \times 0.000010 \times 3.231 = 0.000076$$

【各校の計算式について】

セシウム134						セシウム137						放射性セシウムの 内部被ばく預託実効線量	
検出下限値	×	7～12歳の 実効線量 係数	×	総重量(kg)	+	検出下限値	×	7～12歳の 実効線量係数	×	総重量(kg)	=		
1	0.97	×	0.000014	×	2.912	+	1.1	×	0.000010	×	2.912	≒	0.000072
2	1.1	×	0.000014	×	2.852	+	1.1	×	0.000010	×	2.852	≒	0.000075
3	1.1	×	0.000014	×	3.507	+	0.95	×	0.000010	×	3.507	≒	0.000087
4	1.1	×	0.000014	×	3.104	+	1.1	×	0.000010	×	3.104	≒	0.000082
5	1.0	×	0.000014	×	2.824	+	0.93	×	0.000010	×	2.824	≒	0.000066

(2) 中学校の検査結果および内部被ばくの預託実効線量

学校名	総重量 (kg)	測定結果(下段：検出下限値) 単位：Bq/kg		放射性セシウムの内部被ばく預託実効線量 (mSv)
		放射性セシウム134	放射性セシウム137	
1 南部中学校	3.540	不検出 1.1	不検出 1.2	0 ～ 0.000129
2 逆井中学校	4.215	不検出 0.92	不検出 1.1	0 ～ 0.000134

【根拠】

(例) セシウム134の検出下限値が0.7, セシウム137の検出下限値が0.8, 給食の総重量が3.231kgの場合

$$0.7 \times 0.000019 \times 3.231 + 0.8 \times 0.000013 \times 3.231 = 0.000077$$

【各校の計算式】

セシウム 1 3 4					+	セシウム 1 3 7					=	放射性セシウムの 内部被ばく 預託実効線量				
検出下限値	×	12～17歳の 実効線量係 数	×	総重量 (kg)		検出下限値	×	12～17歳の 実効線量係 数	×	総重量 (kg)						
1	1.1	×	0.000019	×		3.540	+	1.2	×	0.000013			×	3.540	≡	0.000129
2	0.92	×	0.000019	×		4.215	+	1.1	×	0.000013			×	4.215	≡	0.000134